

# 耳・皮膚疾患治療剤

## 動物用 ポリF<sup>®</sup>ローション



**sato** HEALTHCARE INNOVATION

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

動物用医薬品 耳・皮膚疾患治療剤

### 動物用 ポリF<sup>®</sup>ローション

〔成分と働き〕10mL中

成分	分量	働き
酢酸ヒドロコルチゾン	30mg	かゆみやはれなどの炎症を抑えます。
リドカイン	200mg	かゆみ、痛みを抑えます。
イソプロピル メチルフェノール	10mg	殺菌作用により、細菌感染による皮膚病の悪化を防ぎます。

〔効 能〕

犬、猫：外耳炎、アレルギー性皮膚炎、急性・慢性湿疹

〔用法・用量〕

通常、1日1～2回適量を患部に滴下し塗布します。  
使用前によく振り混ぜてください。

<犬猫の次のような動作にご注意ください>

●**耳の病気**

1. 脚でかいたりして、大変かゆがります。夜でもかゆさのためになくことがあります。
2. 化膿して痛むと、頭を振ったり、ないてさわらせないようにになります。

●**皮膚の病気**

1. かゆさのため、皮膚をかむ、脚で皮膚をかく、柱や壁に皮膚をこすりつけるなどの動作がみられます。
2. 症状がすすむと、毛づやがなくなったり、毛が抜けたりすることもあります。

裏面につづく

【使用上の注意】

〔一般的注意〕

1. 本剤は定められた用法・用量を厳守してください。
2. 本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用してください。

〔対象動物に対する注意〕

1. 制限事項

鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎に対しては使用しないでください。

2. 副作用

本剤を長期連用すると皮膚萎縮等の副作用がみられますので注意してください。

3. 適用上の注意

- (1) 患部に付着している痂皮(かさぶた)などは、できる限り除去して使用してください。
- (2) 耳介内面及び外耳道の余分な被毛は、できるだけ除去して使用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手のとどかない所に保管してください。
2. 直射日光をさげ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
3. 誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 温度40℃以上になる所に置かないでください。自動車の車内(ダッシュボードなど)や暖房器具の近くなどに放置すると容器が変形することがあります。
5. よく振り混ぜてから使用してください。
6. 使用の期限をすぎた製品は、使用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせ申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間:9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
**佐藤製薬株式会社**  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号