



2009年9月改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

ウロバランス

(牛車腎気丸料水製エキス製剤)

ウロバランスは…

10種類の生薬から成る漢方処方^{ゴシャジンキガン}「牛車腎気丸」のエキスを飲みやすい細粒にした製剤です。「牛車腎気丸」は中国の医書「済生方」に収載されている漢方処方です。疲れやすく、手足が冷えやすく、尿量が少なく、むくみがある方の症状に効果をあらわします。
(牛車腎気丸は、八味地黄丸にゴシツとシャゼンシを加えた処方です。)

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください
生後3ヵ月未満の乳児。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
そ の 他	のぼせ、どうき

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください

下痢

〔効能〕

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）

〔用法・用量〕

下記の1回服用量を、食前又は食間に服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
7～14才	2/3包	
4～6才	1/2包	
2～3才	1/3包	
2才未満	1/4包	

（食間とは食後2～3時間を指します。）

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

〔成分・分量〕3包中（6.0g）

牛車腎気丸料水製工キス	7.0g
シオウ	2.5g
サンシュユ	1.5g
サンヤク	1.5g
タクシャ	1.5g
ブクリョウ	1.5g
ポタンピ	1.5g
ケイヒ	0.5g
ブシ末	0.5g
ゴシツ	1.5g
シャゼンシ	1.5g

添加物として、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、デキストリン、D-マンニトール、乳糖水和物、香料を含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

本剤は生薬を原料としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間:9:00～17:00（土、日、祝日を除く）