

カルシウム主薬製剤 カルカルシン[®]ソフト

カルシウム・ビタミン配合

カルカルシンソフトは…

- 虚弱体質・腺病質の場合の骨歯の発育促進に効果のあるのみやすい淡黄色の二重錠です。
- カルシウムの吸収を高めるビタミンD₃や発育期のお子様、妊娠授乳婦の方に大切なビタミンB群を配合しています。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って
医師又は薬剤師にご相談ください
服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください
便秘、下痢
4. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師にご相談ください

【効能】

- 虚弱体質・腺病質の場合の骨歯の発育促進
- 妊娠授乳婦の骨歯の脆弱(ぜいじゃく)防止

【用法・用量】

下記の1回服用量を食後に服用します。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	3錠	3回
11～14才	2錠	
5～10才	1錠	
5才未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
 - (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 【成分・分量と働き】9錠中

成分	分量	働き
【外層】淡黄色		
リン酸水素カルシウム	1,600mg	骨や歯の形成維持に効果をあらわします。
ビタミンB ₁ 硝酸塩	3mg	身体の働きに欠かせないビタミン類です。
ビタミンB ₂	2mg	
ビタミンB ₆	6mg	
【内核】白色		
ビタミンD ₃	400i.u.	カルシウムの吸収を助け、骨の発育を促進します。
ビタミンB ₁₂	12μg	身体の働きに欠かせないビタミンです。

※i.u.は国際単位。

添加物として、D-マンニトール、白糖、ポピドン、ステアリン酸Mg、マクロゴール、CMC、サッカリンNa、DL-リンゴ酸、香料、デンプン部分加水分解物、バニリン、エチルバニリンを含有します。

【成分・分量に関連する注意】

本剤はビタミンB₂を含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなる場合があります。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



カルシウムは、牛乳や小魚に多く含まれるミネラルです。骨や歯を丈夫に保つので、育ちざかりのお子様や妊娠授乳婦の方にとっては大切な成分です。

また、ビタミンDは、魚の油の中に多く含まれていますが、日光に当たると人間の体内でも作ることができます。カルシウムの吸収を助ける働きがあることでも知られているビタミンです。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせください。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(6412)7333
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号