

総合かぜ薬

つらいせき、発熱に効く

ストナプラス2

ストナプラス2は…

- **せきと発熱に対する効果を高めた総合かぜ薬です。**
甘草、車前草の他3種類の鎮咳剤がつらいせきの症状をやわらげます。アセトアミノフェン・エテンザミドを配合し、すぐれた解熱作用をあらわします。
- **発熱などで消耗しやすいビタミンCを配合しています。**
- **服用しやすいカプセル型の錠剤(キャプレット)です。**

使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
- 次の人は服用しないでください
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
 - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
 - 服用時は飲酒しないでください
 - 長期連用しないでください

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
 - 高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人
高熱、むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、悪苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。 (これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。)
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこばわる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください
便秘、口のかわき

【効 能】

かぜの諸症状(せき、発熱、悪寒、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】

下記の1回服用量を食後なるべく30分以内に服用します。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	2錠	3回
15才未満	服用しないでください	

【用法・用量に関する注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成分・分量と働き】6錠中

成 分	分 量	働 き
甘草エキス末	142.86mg	せきを鎮めたり、のどの炎症を抑えるなどかぜの諸症状に効果をあらわします。
車前草乾燥エキス	150mg	せきを鎮めたり、のどや気管の粘液の分泌を高め、たんを出しやすくします。
アセトアミノフェン	450mg	熱をさげ、痛みを抑えます。
エテンザミド	750mg	それぞれの成分が効果的に働き、つらいせきを鎮めます。
リン酸ジヒドロコデイン	24mg	
ノスカピン	48mg	
dL-塩酸メチルエフェドリン	60mg	
塩酸ジフェニルピラリン	4mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状を抑えます。
ビタミンC	500mg	発熱などにより消耗したビタミンCを補います。
無水カフェイン	75mg	熱や痛みをとる成分の働きを高めます。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、ポビドン、ラウリル硫酸Na、タルク、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール、酸化チタン、リン酸リボリンNaを含有します。

◎保管及び取扱上の注意

- 本剤は吸湿しやすいためアルミ袋に入れてあります。袋を開封後、万一、シートの裏面が破損(あな等)してしまいますと、吸湿して濃褐色に変わることがありますのでご注意ください。
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



◎早くよくなっていただくためのアドバイス

- 睡眠をとり無理をしないことが治療の第一歩。特に熱がある時、せきが出る時には、できるかぎり仕事や家事を休み、床につきましょ。
- 衣服や寝具は体をあたたかく保てるものを。もちろん部屋もあたたかくなるべく湯気をたてて空気の乾燥を防ぎましょ。
- 汗をかいたらタオルでふいて、下着をとりかえ、体を冷やさないようにしましょう。入浴は熱がさがっても1~2日は、がまんましょ。
- 食事はあたたかいもの、水分やビタミンの多いもの、カロリーの高いもの、消化のよいものをとりましょ。



製中用検査薬(薬剤師のお願い)合わせ券
(株)医薬品医療機器総合機構
http://www.jmda.go.jp/kenkoujissai.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(6412)7383
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日も除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号