

鼻炎用点鼻薬

ナザール[®] 「スプレー」

鼻づまり・鼻水に

- 霧状の小さな粒子が鼻腔内にいきわたり、鼻づまり、鼻水に効果をあらわします。
- 塩酸ナファゾリンの働きにより鼻腔内の血管を収縮させ、うっ血や炎症を抑え、鼻の通りをよくします。
- マレイン酸クロルフェニラミンの働きにより、鼻腔内のアレルギー症状を抑え、効果をあらわします。
- 一定量の薬液が噴霧できるスプレーです。一度スプレーした液は、容器内に逆流しませんので衛生的です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の診断を受けた人。



高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

(2) 3日間位使用しても症状がよくならない場合

【効 能】

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
鼻づまり、鼻水(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重

【用法・用量】

年 齢	1回使用量	1日使用回数
大人(15才以上)	1〜2度	6回を限度として鼻腔内に噴霧してください なお、適用間隔は3時間以上おいてください
7〜14才	1〜2度	
7才未満		使用しないでください

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用しますと、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用のみで使用してください。

【使用方法】



【使用にあたっての注意】

- (1) ご使用前には鼻をかみ、鼻腔の通りをよくしておいてください。
- (2) 最初にご使用になるときは、液がでるまで数回押ししてください。
- (3) 容器を横にして使用しますと、薬液が霧状になりませんので、必ず上向きにしてお使いください。
- (4) ノズルの先端を針等で突くと折れた時危険ですのでおやめください。
- (5) ご使用後はノズルをティッシュペーパーなどでふいて、清潔に保ってください。

【成分・分量と働き】 100mL中

成 分	分 量	働 き
塩酸ナファゾリン	50mg	鼻腔内の血管を収縮させ、うっ血や炎症を抑え、鼻づまりを改善します。
マレイン酸クロルフェニラミン	500mg	アレルギーによる鼻づまり、鼻水を楽にします。
塩化ベンザルコニウム	10mg	殺菌作用により、細菌による鼻粘膜の炎症を抑えます。

添加物として、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、リン酸二水素K、リン酸水素2K、ウエン酸、塩化Na、香料(フェニルエチルアルコール、ベンジルアルコール、ポリソルベート20を含む)を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にカバーをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお問い合わせください。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間: 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号