胃腸薬
イノセア胃腸内服液 30mL
第２類医薬品

ご使用前に次の説明文を必ずお読みください。

[使用上の注意] してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
1.次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。 **2.**長期連用しないでください 相談すること
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1)医師の治療を受けている人。(2)次の診断を受けた人。 腎臓病 **2.** 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください 便秘、下痢 **3.**2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

[効　能] 胃痛、胃部膨満感、胃部不快感、胃重、胸つかえ、もたれ(胃もたれ)、胸やけ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃酸過多

金属:キャップ　ガラス:瓶　Ⓙ

胃の痛み 第2類医薬品
二日酔のむかつきに
イノセア®
胃腸内服液

INOSEA SOLUTION

[成分・分量] 1瓶(30mL)中
スクラルファート水和物 500mg/メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 500mg/合成ヒドロタルサイト 250mg/コウボク流エキス 0.2mL(196mg)(厚朴200mgに相当)/ソウジュツ流エキス 0.2mL(196mg) (蒼朮200mgに相当)

添加物として、ヒドロキシプロピルデンプン、白糖、パラベン、アルコール、香料(*l*-メントールを含む)を含有します。

製造販売元 佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
電　話　03-5412-7393

30mL

[用法・用量]
大人(15才以上)1回1瓶(30mL)、1日3回食前又は食間に服用します。

〈用法・用量に関連する注意〉
☆服用前に瓶をよく振ってください。
定められた用法・用量を厳守してください。

4954626964

使用期限

製造記号

[保管及び取扱い上の注意]
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。) (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931