

2012年7月記載要領変更に伴う改訂

下線部:2012年3月改訂

第2類  
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



## 解熱鎮痛薬

熱・痛みによく効く

## こどもリフグルサット

水なしでのめる、サッと溶ける

## こどもリングルサットは…

- 水なしでのめ、サッと溶けますので外出先での急な発熱や痛みにも適しています。
- 錠剤の苦手なお子様にもおすすめです。
- 眠くなる成分は入っていません。

 使用上の注意 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
  - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
3. 服用前後は飲酒しないでください
4. 長期連用しないでください



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
  - (3)高齢者。
  - (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5)次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンソンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなつた皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。



症状の名称	症 状
腎 障 害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

3.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください  
※本剤は小児用ですが、解熱鎮痛薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

### 〔効能〕

- ・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- ・悪寒・発熱時の解熱

### 〔用法・用量〕

下記の1回服用量を、なるべく空腹時をさけ、かむか口中で溶かして服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
11~14才	4錠	3回を限度とします
7~10才	3錠	
5~ 6才	2錠	
5才未満	服用しないでください	

### 〔用法・用量に関する注意〕

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 〔3)錠剤の取り出しお

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。



（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

- 本剤は壊れやすいため、爪を立てずに指の腹で押して、PTPシートから取り出してください。また、PTPシートから取り出す際、アルミ箔が丸く切り取られることがありますので、切り取られたときには、一緒に飲まないようにご注意ください。
- (4)本剤は、割れたり欠けたりすることがあります。効果に変わりはありません。割れたり欠けたりした分も含めてお飲みください。また、取り出した錠剤は早めにお飲みください。
  - (5)本剤は、水で飲んでも差し支えありません。

### 〔成分・分量と働き〕12錠中

成 分	分 量	働 き
アセトアミノフェン	600mg	熱をさげ、痛みを抑えます。

添加物として、エリスリトール、D-マンニトール、ポビドン、サッカリンNa、三二酸化鉄、タルク、香料（デンプン部分加水分解物、グリセリン、バニлинを含む）、その他2成分を含有します。

### 〔④保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (5)錠剤を湿気の多い所に放置した場合やわらかくなることがあります。

