



2011年10月
記載要領変更に伴う改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品


アレルギーによる鼻水・鼻づまりに **点鼻薬**

ナザールブロック[®]

クロモグリク酸ナトリウム配合

ナザールブロックは…

- クロモグリク酸ナトリウムに抗ヒスタミン剤のクロルフェニラミンマレイン酸塩、血管収縮剤のナファゾリン塩酸塩を配合することにより、アレルギーの原因となる化学伝達物質の放出を抑制するとあわせて、起こってしまったアレルギー症状を緩和します。
- 花粉やハウスダストなどによる鼻水、鼻づまりなどつらいアレルギー症状に効果をあらわします。



クロモグリク酸ナトリウム



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
 - (6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
鼻	刺激感、出血、はれ
精神神経系	頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

3. 3日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効能】

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:
鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、くしゃみ、頭重(頭が重い)

【用法・用量】




年齢	1回使用量	1日使用回数
成人(15才以上)	1噴霧ずつ	3~5回を両鼻腔内に噴霧してください なお、適用間隔は、3時間以上おいてください
7~14才		
7才未満		

3日間使用しても症状の改善がみられない場合には使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用しますと、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 7才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用에만使用してください。

〈使用方法〉

			
使う前にやさしく鼻をかんでください。(あまりきつくかまないでください。)	カバーをはずして図のように容器を持ってください。(使い始めは、液が噴霧するまで数回、空押ししてください。)	ノズルの先を軽く鼻腔内に入れ、1回に1度ずつ薬液を噴霧します。もう一方の鼻腔でも同じ操作を繰り返してください。	容器を清潔に保つため、使用後は鼻に接する部分を拭いてからカバーをしてください。

〈使用にあたっての注意〉

- (1) 容器を横にして使用しますと、薬液が霧状になりませんので、必ず垂直にしてお使いください。
- (2) ご使用前には鼻をかみ、鼻腔の通りをよくしておいてください。
- (3) ご使用後はノズルをティッシュペーパーなどで拭いて、清潔に保ってください。
- (4) 容器の先が鼻汁等に触れると、薬液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。

【成分・分量と働き】 100mL中

成分	分量	働き
クロモグリク酸 ナトリウム	1g	アレルギーの原因となる化学伝達物質の放出を抑え、鼻のアレルギー症状を緩和します。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	0.25g	抗ヒスタミン作用により、アレルギーによる鼻水、鼻づまりを抑えます。
ナファソリン塩酸塩	0.025g	血管収縮作用により、鼻腔粘膜のうっ血を取り除き、鼻づまりに効果をあらわします。

添加物として、エデト酸Na、等張化剤、グリセリン、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にカバーをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **佐藤製薬株式会社**
東京都港区元赤坂1-5-27

製造販売元 **第一三共ヘルスケア株式会社**
東京都中央区日本橋3-14-10