



2012年7月 記載要領変更に伴う改訂

第2類  
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



胃腸鎮痛鎮痙薬

# ブチスコミン®

胃痛・腹痛・さしこみに

ブチスコミンは…

- 鎮痛・鎮痙作用にすぐれたブチルスコポラミン臭化物を配合しています。
- 急な胃痛、つらい腹痛・さしこみにすぐれた効果をあらわします。
- 服用しやすい白色の糖衣錠で、1回1錠でよく効きます。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください  
 口のかわき、便秘、目のかすみ
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

### 〔効 能〕

胃痛、腹痛、さしこみせんつうしゃく(疝痛、疝)、胃酸過多、胸やけ

### 〔用法・用量〕

下記の1回服用量を服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1錠	3回を限度とします
15才未満	服用しないでください	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。  
 (2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTP シートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



### 〔成分・分量と働き〕3錠中

成 分	分 量	働 き
ブチルスコポラミン臭化物	30mg	副交感神経に働き、胃や腸のけいれんをやわらげ、胃痛、腹痛、さしこみの痛みを鎮めます。また、胃酸の分泌を抑えますので胃酸過多や胸やけにもすぐれた効きめをあらわします。

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、炭酸Ca、酸化チタン、白糖、ポビドン、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、カルナウバロウを含有します。

### ◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。  
 (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
 (誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)  
 (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
**(独) 医薬品医療機器総合機構**  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
**佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口**  
 電話 03(5412)7393  
 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
**佐藤製薬株式会社**  
 東京都港区元赤坂1丁目5番27号