

2014年3月 改訂

動物用医薬品
要指示医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



抗生物質製剤

動物用・マイコクロリン[®]眼軟膏

注意 - 獣医師等の処方せん・指示により使用すること
注意 - 使用基準の定めるところにより使用すること

動物用・マイコクロリン眼軟膏は、クロラムフェニコール系抗生物質のクロラムフェニコールを有効成分とした抗菌剤です。クロラムフェニコールは、広範囲な抗菌作用をあらわし、ブドウ球菌、連鎖球菌、肺炎球菌、淋菌、髄膜炎菌、大腸菌、リケッチアなどによって起こる犬、猫の眼疾患に効果があります。

〔性状〕

動物用・マイコクロリン眼軟膏は、白色でにおいはほとんどない軟膏です。

〔成分・分量〕 1g中

クロラムフェニコール……………20mg(力価)

〔効能〕

犬、猫：クロラムフェニコール感受性菌による眼瞼炎、結膜炎、角膜炎

〔用法・用量〕

1日数回塗布します。

★裏面につづく

〔使用上の注意〕

【一般的注意】

- ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
- ・本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
- ・定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤の使用に当たっては、治療上必要な最小限の期間の投与に止めることとし、週余にわたる連続投与は行わないこと。

注意：本剤は、薬事法第 83 条の 4 の規定に基づき使用者が遵守すべき基準として使用禁止用途が定められた動物用医薬品ですので、以下の用途には使用しないでください。

〈使用禁止用途〉

食用に供するために出荷する対象動物（牛、馬、豚、鶏、うずら、みつばち及び食用に供するために養殖されている水産動物）及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用

【使用者に対する注意】

- ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- ・本剤の有効成分（クロラムフェニコール）は、人に用量非依存的に再生不良性貧血を起こすとの報告があることから、使用者は注意して慎重に使用すること。

【犬・猫に対する注意】

1. 副作用

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- ・本剤の使用により過敏症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

- ・本剤は眼科用にのみ使用すること。

【取扱い上の注意】

- ・最終有効年月をすぎた製品は、使用しないこと。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

【保管上の注意】

- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- ・誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

〔有効期間〕

本剤の有効期間は、製造日より3年間です。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号