



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ノアールワンSGは…

抗菌目薬 ノアールワン[®] SG

サルファ剤+抗炎症剤配合

衛生的な使いきりタイプ

- 結膜炎やものもらいの原因菌に抗菌作用をあらわすスルファメトキサゾールナトリウムに、まぶたのただれなどの目の炎症を鎮めるグリチルリチン酸二カリウムを配合しています。
- いつでも衛生的な1回使いきりタイプの目薬です。
- 防腐剤を含んでいませんので刺激が少なく、炎症のある目にもやさしいさしごちです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください



相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)次の症状のある人。

はげしい目の痛み



2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

- (1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2)3~4日間使用しても症状がよくなる場合

【効 能】

結膜炎(はやり目)、ものもらい、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ

「ものもらい」についての注意

まぶたをこすったり、目に刺激を加えないようご注意ください。ものもらいは体質的に起こりやすい場合があります。過労や睡眠不足など体力が低下しているときに起こりやすいので、なるべく無理をせず睡眠も十分とるように心がけてください。

〔用法・用量〕

1日3～6回、1回1～3滴点眼します。

ご使用法



①容器の先端を無理にひっぱらず、ゆっくり回して開けてください。



②2～3滴捨てたあと、1回1～3滴を点眼してください。(1本で両目に点眼できます。)



③点眼のときは目から離してください。

- 容器には多めに薬液が入っています。一度開封したものは薬液が残っていても必ず捨ててください。
- 本品は光による薬液の変質を防ぐため、着色した容器とアルミ袋を使用しています。保管の際は箱に戻すなど光が当たらないようにしてください。(薬液は無色透明です。)

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)開封の際に、いきおいよく開封したり、強く押えて開封すると薬液が飛び散ることがありますので、ゆっくり開封してください。
- (3)使用の際には、最初の2～3滴は点眼せずに捨ててください。
- (4)容器を開封するとき、切り方によっては切り口に凹凸が生じる場合もありますので、容器の先端が目に触れないように注意してください。
- (5)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (6)本剤は防腐剤を含まない1回使いきりタイプの目薬ですので、使用後の残液は捨ててください。
- (7)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (8)点眼用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕1本 0.5mL

成分	分量	働き
スルファメトキサゾールナトリウム	4.0%	結膜炎やものもらいの原因菌に抗菌作用をあらわすサルファ剤です。
グリチルリチン酸二カリウム	0.1%	ものもらいやまぶたのただれなどの目の炎症を鎮めます。

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Naを含有します。

●保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。
- (6)ズボンの後ろポケット等に携帯すると、容器が開封されてしまうことがありますので、ご注意ください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせください。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間:9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号