

第2類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ず
お読みください。また、必要な時読め
るよう大切に保管してください。



化膿性皮膚疾患用薬

ポリは…

ポリ[®]

ジュクジュク型の
すり傷・きり傷などの化膿に

- 化膿してジュクジュクしている傷やお
でき、とびひの症状におすすめします。
- サルファ剤配合で化膿を抑えます。
- 患部を乾かす白色の軟膏(水溶性基
剤)です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 患部が広範囲の人。
 - (4) 湿潤やただれのひどい人。
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

化膿性皮膚疾患、とびひ、にきび

〔用法・用量〕

患部に適量を1日2～3回塗布します。
潰瘍部や滲出液の多い部分にはガーゼに
のばして貼布します。



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

◎水溶性基剤

患部の滲出液などを吸い上げ、乾燥させる作用が強いので、特にジュークジュークしている時に効果的です。



〔成分・分量と働き〕

成分	分量	働き
スルファジアジン	5.0%	傷やおできが化膿する原因となるブドウ球菌や大腸菌などに対する抗菌作用で化膿を抑えます。
ジフェンヒドラミン	0.5%	炎症によるかゆみを抑え、不快な症状をとりのぞきます。
酸化亜鉛	20.0%	収れん作用により、患部の治りを早め、滲出液を吸収します。

添加物として、亜硫酸水素Na、ビタミンE、プロピレングリコール、マクロゴールを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



◎化膿性皮膚疾患について

私たちの皮膚は、もともと細菌や外部の刺激から身体を守る役目をしています。

しかし、すり傷、きり傷、湿疹、かぶれなど皮膚に障害が起こると細菌に感染し、化膿しやすくなります。

おでき、めんちょう、とびひなどは化膿性皮膚疾患にあたります。

- ・患部を清潔にしましょう。
- ・さわったり、むりやりウミを出すのはやめましょう。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号