



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミン含有保健薬

滋養強壯、肉体疲労・食欲不振時の栄養補給

エンケルゾンネ[®]ロイヤル

- エンケルゾンネロイヤルは「疲れやすい」「疲れがとれにくい」「食欲がない」などの症状を訴える方の滋養強壯保健薬です。
- エレウテロコック乾燥エキス、黄精エキス、イカリソウエキス乾燥-Aなどの滋養強壯や肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわす11種類の生薬に3種類のビタミンを配合しました。
- バックジュツ末、ヤクチ末、リュウタン末、デヒドロコール酸が消化機能を高め、滋養強壯に効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、悪心・嘔吐

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください
便秘、下痢

〔効 能〕

- 滋養強壯
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
- 虚弱体質

〔用法・用量〕

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	2錠	2回
15才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)錠剤の取り出し方(PTP包装の場合)

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



〔成分・分量と働き〕4錠中

成分	分量	働き
エレウテロコック乾燥エキス	60mg	エゾウコギの根
黄精エキス	45.05mg	ナルコユリの根茎
イカリソウエキス乾燥-A	100mg	イカリソウの地上部
ガラナ乾燥エキス	200mg	ガラナの種子
竜眼肉エキス	60mg	リュウガンの果肉
ジオウ末	40mg	アカヤジオウの根
西洋サンザシ乾燥エキス	40mg	西洋サンザシの花
乾燥ローヤルゼリー	100mg	ミツバチの咽頭腺でつくられる乳状物で、滋養強壮に効果をあらわします。
ビャクジュツ末	300mg	オケラの根茎
ヤクチ末	100mg	ヤクチの果実
リュウタン末	50mg	トウ lindウの根
デヒドロコール酸	20mg	脂肪の消化・吸収を促して、滋養強壮に効果をあらわします。
ベンフォチアミン (ビタミンB ₁ 誘導体)	10mg	身体の働きに欠かせないビタミン類で、肉 体疲労時の栄養補給、滋養強壮に効果を あらわします。
酪酸リポフラビン (ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	10mg	
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	5mg	

添加物として、無水ケイ酸、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、白糖、三酸化鉄、カルナウバロウを含有します。



〈成分・分量に関連する注意〉

本剤はビタミンB₂酪酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に(瓶入れの場合は密栓して)保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間:9:00~18:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号