

飲みすぎ、食欲不振、
二日酔い・悪酔いのむかつき

ハイウルソU

ウルソデオキシコール酸配合

△ 使用上の注意

🏠 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

■効能 食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

■用法・用量 成人(15才以上)1回1本(30mL)、1日2回を限度とし服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

●15才未満は服用しないでください。●定められた用法・用量を厳守してください。

■成分・分量 2本(60mL)中 ウコン流エキス 1mL(原生薬換算量:1,000mg)、ニンジン流エキス 1mL(原生薬換算量:1,000mg)、ソウジュツ流エキス 1mL(原生薬換算量:1,000mg)、ショウキョウ流エキス 0.6mL(原生薬換算量:600mg)、ゲンチアナ流エキス 1mL(原生薬換算量:1,000mg)、ケイヒ流エキス 1mL(原生薬換算量:1,000mg)、アカメガンシウエキス 100mg(原生薬換算量:1,000mg)、ウルソデオキシコール酸 40mg

添加物として、ハチミツ、白糖、カラメル、デキストリン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、安息香酸Na、dl-リンゴ酸、香料(エチルバニリン、バニリンを含む)、pH調整剤を含有します。

■保管及び取扱い上の注意 1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 2. 小児の手の届かない所に保管してください。 3. 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
お問い合わせ先TEL:03-5412-7393

Ⓐ

★本品には添付文書はついておりません。外箱の記載文を代用しています。