



# sato

## セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

2014年2月 使用上の注意改定（下線部）

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

### 第2類医薬品

## 鎮痛消炎薬

# サロメチール<sup>®</sup>FBローション $\alpha$

## フェルピナク3.0%<sup>配合</sup>

肩こりの痛み・腰痛・関節痛に

### サロメチールFBローション $\alpha$ は…

- 痛みやはれに効くフェルピナクを3.0%配合した非ステロイド系の鎮痛消炎薬です。
- フェルピナクが痛みの発生に関与するプロスタグランジンの生成を抑制して肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- 背中、腰などの手の届きにくいところにも塗りやすい容器です。
- l*-メントール3.0%配合により、塗布後心地よい清涼感があります。



### 使用上の注意

#### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

#### 1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15才未満の小児。

#### 2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口又は化膿している患部。



#### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 1週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

## 〔効 能〕

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

## 〔用法・用量〕

1日2～4回、適量を患部に塗布してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 塗布した部分をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

## 〔成分・分量と働き〕 100mL中

成 分	分 量	働 き
フェルピナク	3.0g	非ステロイド系の鎮痛消炎成分で、痛みやはれを鎮めます
ℓ-メントール	3.0g	清涼感を与え、痛みをやわらげます

添加物として、BHT、エタノール、クエン酸、ジイソプロパノールアミン、マクロゴール、グリチルレチン酸、ヒプロメロースを含有します。

### ◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用済みの容器は火中に投じないでください。
- (6) 本剤のついた手で、目等の粘膜に触れないでください。
- (7) メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (8) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。  
また、開封後は使用期限内であってもなるべくすみやかに使用してください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
**(独) 医薬品医療機器総合機構**  
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
**佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口**  
電話 03(5412)7393  
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
**佐藤製薬株式会社**  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号