



2014年6月 記載要領変更に伴う改訂

第3類
医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミンC製剤

ハクビホワイトC

L-システイン配合

- ハクビホワイトCは、L-システインを240mgとビタミンCを600mg配合(成人1日量)のしみ、そばかす、日やけによる色素沈着を緩和するビタミンC製剤です。
- ビタミンB₆が皮ふの新陳代謝を促し、パントテン酸カルシウムが、ビタミンCの働きを助けて効果をあらわします。
- 肉体疲労時・病中病後の体力低下時のビタミンCの補給にも役立ちます。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	吐き気・嘔吐、腹痛



2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
 - 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

〔用法・用量〕

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	3回朝昼晩に服用します
7~14才	1錠	
7才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈成分・分量と働き〉6錠中

成分	分量	働き
L-システイン	240mg	皮ふの新陳代謝を活発にし、メラニンの排泄を促進して、しみ、そばかす、日やけによる色素沈着の緩和に効果をあらわします。
アスコルビン酸 (ビタミンC)	600mg	黒色のメラニンを淡色化して、しみ、そばかす、日やけによる色素沈着の緩和に効果をあらわします。又、血管を強くする働きがあり、歯ぐきからの出血、鼻出血の予防に効果をあらわします。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	6mg	皮ふの新陳代謝を活発にし、効果をあらわします。
パントテン酸 カルシウム	24mg	ビタミンB群の一種で、ビタミンCの働きを助けます。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、乳酸Ca、カルナウバロウ、タルク、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、還元麦芽糖水アメ、炭酸Ca、アラビアゴム、酸化チタン、ポビドン、シメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



●お肌を美しく保つためのアドバイス

1. 紫外線は年間を通じて照射しています。外出する場合は紫外線の強い時間帯や場所を避けたり、帽子やパラソル、UVカット剤などを利用し、お肌を紫外線から守りましょう。
2. 規則正しい生活をし、栄養バランスのよい生活を心がけ、体調を整えましょう。
3. 日やけした後は、保湿効果のあるローションなどを併用し、スキンケアを心がけましょう。
4. 精神的なストレスをためないように、運動や趣味などで気分転換をはかりましょう。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号