

sato 第3類医薬品

筋肉痛・関節痛 肩こりに サロメチル® ゾル

うちみ・ねんざ・腰痛に

サリチル酸メチル配合



Salomethyl®

セルメタマケーション
税 控除 対象

130mL

ご使用前に下記の説明文を必ずお読みください。

スプレー式外用鎮痛消炎薬 第3類医薬品
サロメチル・ゾル 130mL

スポーツ時の筋肉の疲れ、筋肉痛、関節痛、肩こり、腰痛、うちみ、ねんざによく効きます。メントールのさわやかな香ります。

▲ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位 症状

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3.5〜6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

■効能 筋肉疲労、筋肉痛、関節痛、肩こり、腰痛、打撲、捻挫、しびれやけ

■用法・用量 1日数回、適量を患部に噴霧します。

＜用法・用量に関連する注意＞

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(4)顔に向けて噴霧しないでください。(5)大量・広範囲には使用しないでください。(6)外用にのみ使用し、吸入しないでください。吸入によりめまい、吐き気等の症状を起こすことがありますので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意して


使用してください。(7)入浴前後の使用はさけてください。(8)入浴等で肌をこすったり、夏場など汗をかいた時は、本剤による刺激を強く感じる場合があります。熱い湯みやお湯洗いやかゆみを感じた場合には、使用を中止し、石けんをよく洗って、こすらないでやさしくなでるよう患部を数回水で洗った後、冷水や軽くしぼったぬぐタオルなどで十分に冷やしてください。症状の改善がみられない場合は、本品を持って医師にご相談ください。(9)使用期間によく振とうしてください。(10)患部まで10cmの距離で噴霧してください。(11)同じ箇所に連続して3秒以上噴霧しないでください。

■成分・分量 (原液100mL中)

1-メントール 3.5g、サリチル酸メチル 2g、サリチル酸グリコール 2g、ジフェニヒドラミンサリチル酸塩 0.5g、グリチルリチン酸 0.2g、ニコチン酸ベンジル 20mg、アリニカチンキ 0.5g
添加物：プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬質マシ油、アルコール、パラセチル、しよ糖、香料、フェニルエチルアルコール、d-α-トコフェロールを含む。LPG、DME、二酸化炭素

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手が届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(4)使用期限(底面に記載)をすぎた製品は、使用しないでください。(5)本剤が衣類や家具、床、食品製品、化粧品等に付着しないよう注意してください。変質又は変色するおそれがあります。(6)捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまで下図の説明に従ってガスを抜いてください。(7)火気に近づけないでください。
※横向きにして使用しないでください。

ガス抜きキャップ付き



缶に巻かれているシリコンフィルムがなくなっている場合は購入しないでください。

火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるところやストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。

高压ガス：DME、LPG、炭酸ガス

第二石油類 110.5mL 火気厳禁 製造販売元

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
製品のお問い合わせ先 ☎03-5412-7393

使用期限、製造番号は底面に記載

金属：缶
キャップ：PP
ボタン：PP
外装フィルム：PP

副作用救済制度 ☎0120-149-931



登録商標