



sato

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

2012年12月記載要領変更に伴う改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

サロメチール[®]



外用鎮痛消炎薬

手足や腰は疲れると血液の循環や新陳代謝の異常などが起こり、痛み・こりとして感じられます。

- サロメチールは、すぐれた浸透性をもつ軟膏剤です。
- サロメチールは、患部にすりこむと皮膚を通して吸収され、炎症や痛みをやわらげて、運動前後の筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、関節炎などによく効きます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)


次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合場合は使用を中止し、
この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

運動前後の筋肉疲労、打撲、捻挫、頭痛、歯痛、肩凝、凍傷、ロイマチス、神経痛、関節炎、毒虫咬傷、皮膚癌痒症、咽喉痛、感冒性関節炎

運動前後の
筋肉疲労



打撲、ねんざ



肩こり



〔用法・用量〕

1日数回、患部に適宜塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤のついた手で、目などの粘膜にふれないでください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 打撲、ねんざ等の急性症状にはハレがひいてから使用してください。
- (7) 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (8) 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (9) 皮膚の弱い方は、同じ所に続けて塗擦しないでください。
- (10) **入浴前後での使用はさけてください。**
- (11) 時計、めがね等の金属類、電気毛布等で温めないでください。
- (12) 入浴等で肌をこすったり、夏場など汗をかいた時は、本剤による刺激を強く感じる場合があります。

激しい痛みや刺激感やかゆみを感じた場合には、

使用を中止し、石けんをよく泡立て、こすらないでやさしくなでるように患部を数回水で洗った後、患部を冷水や軽くしぼったぬれタオルなどで十分に冷やしてください。症状の改善がみられない場合は、この文書を持って医師にご相談ください。

〔成分・分量と働き〕 1g中

成分	分量	働き
サリチル酸メチル	190mg	皮膚から容易に吸収され、患部の血液の流れを改善し、新陳代謝を良くし、筋肉疲労や打撲、ねんざなどに伴う炎症や痛みを抑えます。
サリチル酸グリコール	10mg	
dl-カンフル	70mg	知覚神経の末梢に作用して筋肉疲労や打撲、ねんざなどによる痛みを抑えます。
l-メントール	60mg	
カプサイシン	0.25mg	おだやかな局所温感刺激作用により、局所の血管を拡張させ、血行を改善し、筋肉疲労や肩こりに効果があります。
ニコチン酸ベンジルエステル	0.2mg	
ユーカリ油	10mg	芳香による清涼感があり、かゆみを止める効果があります。
チモール	10mg	殺菌作用があります。

添加物として、ステアリルアルコール、ステアリン酸、ミリスチン酸イソプロピル、水酸化Na、トリエタノールアミン、ポリオキシエチレンソルビットミツロウ、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願ひ申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間:9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号