

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	リングル N
2	成分・分量	<9錠中> アセトアミノフェン 900mg、無水カフェイン 75mg
3	用法・用量	症状があらわれたとき、下記の1回服用量をなるべく空腹時をさけて服用します。 服用時間は4時間以上おいてください。 <1回服用量> 成人(15歳以上) 3錠 11歳～14歳 2錠 5歳～10歳 1錠 5歳未満 服用しないでください。 <1日服用回数> 3回を限度とします。 ●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
4	効能・効果	●悪寒・発熱時の解熱 ●頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 2. 本剤を使用している間は、次の医薬品も使用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬 3. 服用前後は飲酒しないでください 4. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出下さい (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の診断を受けた人 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。