

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ストナEX錠
2	成分・分量	<6錠中> イブプロフェン 600mg、ジフェニルピラリン塩酸塩 4mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、L-カルボシステイン 750mg、無水カフェイン 75mg、リボフラビン 12mg、オウヒエキス 40mg、キキョウ乾燥エキス 222.2mg
3	用法・用量	下記の1回服用量を食後なるべく30分以内に服用します。 <1回服用量> 成人(15歳以上) 2錠、15歳未満 服用しないでください <1日服用回数> 3回
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>(3) 15歳未満の小児。</p> <p>(4) 出産予定日12週以内の妊婦。</p> <p>(5) 医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。</p> <p>胃・十二指腸潰瘍、血液の病気、肝臓病、腎臓病、心臓病、高血圧、ジドブジン(レトロビル等)を投与中の人</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください</p> <p>他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください</p> <p>(眠気等があらわれることがあります。)</p> <p>4. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>5. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>6. 5日間を超えて服用しないでください</p> <p>7. 過量服用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい</p> <p>(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。</p> <p>(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>(3) 高齢者。</p> <p>(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難</p> <p>(6) 次の診断を受けた人又はその病気にかかったことがある人。</p> <p>胃・十二指腸潰瘍、血液の病気、肝臓病、腎臓病、心臓病、高血圧、気管支ぜんそく、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、潰瘍性大腸炎、クローン病、甲状腺機能障害、糖尿病、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。