

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ニコチネル パッチ20、ニコチネル パッチ10
2	成分・分量	ニコチネル パッチ20 (1枚(20cm <sup>2</sup> )中) ニコチン 35mg ニコチネル パッチ10 (1枚(10cm <sup>2</sup> )中) ニコチン 17.5mg
3	用法・用量	最初の6週間はニコチネル パッチ20を1日1回、1枚を起床時から就寝時まで貼付し、次の2週間はニコチネル パッチ10を1日1回、1枚を起床時から就寝時まで貼付してください。禁煙によるイライラなどの症状がなくなり、禁煙を続ける意志が強く、禁煙を続けられる自信がある場合には、6週間のニコチネル パッチ20を使用後、7週目以降のニコチネル パッチ10を使用せずに、本剤の使用を中止してもかまいません。貼付する場所は上腕部、腹部あるいは腰背部に毎日場所を変えて貼付してください。
4	効能・効果	禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください。 (1)非喫煙者〔タバコを吸ったことのない人及び現在タバコを吸っていない人〕 (2)他のニコチン含有する製剤を使用している人 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人 (4)授乳中の人 (5)重い心臓病を有する人 ①3ヵ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人 ②重い狭心症と医師に診断された人 ③重い不整脈と医師に診断された人 (6)急性期脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)と医師に診断された人 (7)うつ病と診断されたことのある人 (8)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください。湿疹、かぶれ、傷口</p> <p>3. 本剤を一度に2枚以上使用しないでください。</p> <p>4. 本剤を使用中及び使用直後は、次のことはしないでください。 (1)ニコチンガム製剤の使用 (2)喫煙</p> <p>5. 本剤を使用中は、サウナの使用や激しい運動はしないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人 (2)他の薬を使用している人 (3)薬などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人 (4)高齢者及び20才未満の人 (5)次の診断を受けた人 心臓病(心筋梗塞、狭心症、不整脈、心不全等)、胃・十二指腸潰瘍、高血圧、肝臓病、腎臓病、糖尿病(インスリン製剤を使用している人)、甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫又はパラガングリオーマ、脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)、末梢血管障害(バージャー病等)、全身性皮ふ疾患(アトピー性皮ふ炎、湿疹性皮ふ炎)、てんかん、神経筋接合部疾患(重症筋無力症、イートン・ランバート症候群) (6)発熱のある人</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。