

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ニコチネル ミント
2	成分・分量	(1個中) ニコチン 2mg
3	用法・用量	タバコを吸いたいと思ったとき、1回1個をゆっくりと間をおきながら、30～60分間かけてかみます。1日の使用個数は下記を目安とし、通常、1日4～12個から始めて適宜増減しますが、1日の総使用個数は24個を超えないください。禁煙になれてきたら(1カ月前後)、1週間ごとに1日の使用個数を1～2個ずつ減らし、1日の使用個数が1～2個となった段階で使用をやめます。なお、使用期間は3ヵ月をめどとします。
4	効能・効果	禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <p>(1) 非喫煙者〔タバコを吸ったことのない人及び現在タバコを吸っていない人〕</p> <p>(2) すでに他のニコチン製剤を使用している人</p> <p>(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人</p> <p>(4) 重い心臓病を有する人</p> <p>①3ヵ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人 ②重い狭心症と医師に診断された人</p> <p>③重い不整脈と医師に診断された人</p> <p>(5) 急性期脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)と医師に診断された人</p> <p>(6) うつ病と診断されたことのある人</p> <p>(7) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人</p> <p>(8) あごの関節に障害がある人</p> <p>2. 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を使用する場合は授乳を避けてください。</p> <p>3. 本剤を使用中及び使用直後は、次のことはしないでください。</p> <p>(1) ニコチンパッチ製剤の使用 (2) 喫煙</p> <p>4. 6ヵ月を超えて使用しないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <p>(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 他の薬を使用している人</p> <p>(3) 高齢者及び20才未満の人 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人 腹痛、胸痛、口内炎、のどの痛み、のどのはれ</p> <p>(6) 医師から次の診断を受けた人 心臓疾患(心筋梗塞、狭心症、不整脈)、脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)、末梢血管障害(パーリパー病等)、高血圧、甲状腺機能障害、褐色細胞腫又はパラガングリオーマ、糖尿病(インスリン製剤を使用している人)、咽頭炎、食道炎、胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病</p>
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。