

(医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アスコル2000
2	成分・分量	<3包中(1包1.5g)> アスコルビン酸(ビタミンC) 2,000mg、 リボフラビン酪酸エステル 12mg
3	用法・用量	下記の1回服用量を服用します。ただし、1日2回服用する場合は朝夕、 1日3回服用する場合は朝昼晩服用してください。 <1回服用量>成人(15才以上) 1包、11~14才 1包、7~10才 1包、 7才未満 服用しないでください <1日服用回数>成人(15才以上) 1~3回、11~14才 1~2回、 7~10才 1回
4	効能・効果	次の諸症状の緩和： しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着 次の場合の出血予防： 歯ぐきからの出血、鼻出血 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、 医師、薬剤師又は歯科医師にご相談ください。」 次の場合のビタミンCの補給： 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<用法・用量に関連する注意> 7才以上 15才未満に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてく ださい。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の  
薬剤師または登録販売者にご相談下さい。