

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アセスL
2	成分・分量	カミツレチンキ 1.25% ラタニアチンキ 1.25% ミルラチンキ 0.62%
3	用法・用量	適量(1.0g、約3cm)を歯ブラシにつけて、1日2回(朝・夕)歯肉をマッサージするように磨きます。
4	効能・効果	歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状(出血・はれ・口臭・発赤・口のねばり・歯ぐきのむずがゆさ・歯ぐきからのうみ)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3)次の症状のある人。 ひどい口内のただれ
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。