

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アロゲイン5
2	成分・分量	<100mL中> ミノキシジル 5g
3	用法・用量	<1回使用量> 成人男性(20歳以上)、1mLを脱毛している頭皮に塗布。 <1日使用回数> 2回
4	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)女性。 (3)未成年者(20歳未満)。 (4)壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。 (5)脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。 2. 次の部位には使用しないでください (1)本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。 (2)きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。 3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、避けてください。これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。 次に該当する人はお申し出ください (1)今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。 (2)高血圧の人、低血圧の人。 (3)心臓又は腎臓に障害のある人。 (4)むくみのある人。 (5)家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。 (6)高齢者(65歳以上)。 (7)次の診断を受けている人。 甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。