

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	イノセアプラス錠
2	成分・分量	<12錠中> <外層>スクラルファート水和物 1,500mg、 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 900mg、 シロキサリース 78.95mg(ジメチルポリシロキサンとして75mg) <内核>ロートエキス 30mg、 ソウジュツ乾燥エキス 60mg(蒼朮600mg に相当)、 ジアスメンSS 60mg、リパーゼAP6 60mg、 ウルソデオキシコール酸 30mg
3	用法・用量	下記の1回服用量を食後又は食間に服用します。 <1回服用量>大人(15才以上) 4錠、15才未満 服用しないでください <1日服用回数>3回
4	効能・効果	胃痛、胃部膨満感、胃部不快感、胃重、胸つかえ、もたれ(胃もたれ)、胸やけ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食欲不振(食欲減退)、飲み過ぎ(過飲)、食べ過ぎ(過食)、消化促進、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、胃酸過多
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください 透析療法を受けている人。 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。) 4. 長期連用しないでください  次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。排尿困難 (6)次の診断を受けた人。腎臓病、心臓病、緑内障
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。