

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	サロメチールジクロクールローション
2	成分・分量	<1g中>ジクロフェナクナトリウム 10mg、トメントール 30mg
3	用法・用量	1日3～4回適量を患部に塗布します。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
4	効能・効果	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2)ぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>(4)15才未満の小児。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください</p> <p>(1)目の周囲、粘膜等。</p> <p>(2)皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等)。</p> <p>(3)湿疹、かぶれ、傷口。</p> <p>(4)みずむし・たむし等又は化膿している患部。</p> <p>3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください</p> <p>4. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <p>(1)医師の治療を受けている人。</p> <p>(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(3)次の医薬品の投与を受けている人。</p> <p>ニューキノロン系抗菌剤</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。