

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ジーフォーL注入軟膏
2	成分・分量	<1個(2g)中>プレドニゾロン酢酸エステル 1mg、リドカイン 60mg、アラントイン 20mg、トコフェロール酢酸エステル 50mg、
3	用法・用量	【肛門内に注入する場合】ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入してください。 <1回使用量>成人(15才以上) 1個、15才未満 使用しないでください <1日使用回数>1~2回 【肛門部に塗布する場合】次の量を肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。 <1回使用量>成人(15才以上) 適量、15才未満 使用しないでください <1日使用回数>1~3回
4	効能・効果	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)患部が化膿している人。 2. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出下さい (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。