

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ストナリニ・サット小児用
2	成分・分量	<9錠中> d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg、フェニレフリン塩酸塩 15mg、 ベラドンナ総アルカロイド 0.4mg
3	用法・用量	下記の1回服用量を、かむか、口中で溶かして服用します。 服用間隔は4時間以上おいてください。 <1回服用量> 11~14才 3錠、7~10才 2錠、5~6才 1錠、 5才未満 服用しないでください <1日服用回数> 3回
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和： くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、 アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください （眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。） 3. 長期連用しないでください  次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 高齢者。 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難 (6) 次の診断を受けた人。緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧  <用法・用量に関連する注意> 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。