

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ストナリニ Zジェル
2	成分・分量	<1カプセル中>セチリジン塩酸塩 10mg
3	用法・用量	<1回服用量>成人(15歳以上) 1カプセル 15歳未満 服用しないでください。 <1日服用回数>1回(就寝前)
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和: くしゃみ、鼻みず、鼻づまり
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分、ピペラジン誘導体(レボセチリジン、ヒドロキシジンを含む)によりアレルギー症状を起したことがある人。 (2)次の診断を受けた人。腎臓病 (3)15歳未満の小児。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等)及びテオフィリン、リトナビル又はピルシカイニド塩酸塩水和物を含有する内服薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください 4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 5. 服用前後は飲酒しないでください  次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)次の診断を受けた人。肝臓病、てんかん (3)けいれん発作を起こしたことがある人。 (4)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (5)高齢者。 (6)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (7)アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。 (8)気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎等の他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。