

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	タクトL
2	成分・分量	<100g中>リドカイン 0.5g ジフェンヒドラミン塩酸塩 2g グリチルリチン酸ニカリウム 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g 酸化亜鉛 5g トコフェロール酢酸エステル 2g
3	用法・用量	1日数回、適量を患部に塗布します。
4	効能・効果	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3)湿潤やただれのひどい人。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。