

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	トニン咳どめ液D
2	成分・分量	<60mL中>ジヒドロコデインリン酸塩 30mg、 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg、ジフェニルピラリン塩酸塩 6mg、 グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg、キキョウエキス 250mg、 オウヒエキス 40mg、セネガエキス 100mg、ソヨウ流エキス 500mg、 無水カフェイン 64mg
3	用法・用量	下記の1回服用量を食後及び就寝前に服用します。また、場合により、1日6回まで服用できますが、1日5～6回服用する場合には原則として、約4時間の間隔をおいて服用してください。 <1回服用量>大人(15歳以上) 10mL、12～14歳 6.6mL 12歳未満 服用しないでください <1日服用回数>4回
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 12歳未満の小児。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。) 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 5. 過量服用・長期連用しないでください (倦怠感や虚脱感等があらわれるおそれがあります。) 次に該当する人はお申し出下さい (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。高熱、排尿困難 (6)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。