

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ナシビン M スプレー
2	成分・分量	<100mL 中>オキシメタゾリン塩酸塩 0.05g
3	用法・用量	下記の1回量を各鼻腔に噴霧してください。なお、適用間隔は、10～12時間以上おいてください。連続して1週間を超えて使用しないでください。使用を中止した場合は2週間以上あけてください。症状が改善したら使用を中止してください。 <1回使用量>成人(15才以上) 各鼻腔に2～3度ずつ、15才未満は使用しないでください。 <1日使用回数>1～2回噴霧してください。
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による鼻づまり
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)モノアミン酸化酵素阻害剤等を服用している人。モノアミン酸化酵素阻害作用等を有する医薬品は以下のようなものがあり、いずれもパーキンソン病の治療に用いられます。また、ゾニサミドはてんかんの治療にも用いられます。 セレギリン塩酸塩、ゾニサミド、エンタカポン (3)15才未満の小児。 2. 連続して1週間を超えて使用しないでください(本剤の連用により鼻粘膜障害が発現するおそれがあります) 3. 粘膜、創傷面又は炎症部位に長期連用又は大量使用しないでください 次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障  <用法・用量に関連する注意> (1)定められた用法・用量を厳守してください。 (2)本剤は作用時間が長く、1日1～2回の使用で効果を示します。過度に使用しますと、かえって鼻づまりを起こすことがあります。 (3)点鼻用にのみ使用してください。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。