

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ブチスコミン
2	成分・分量	<3錠中> ブチルスコポラミン臭化物 30mg
3	用法・用量	下記の1回服用量を服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。 <1回服用量>大人(15才以上) 1錠、15才未満 服用しないでください <1日服用回数>3回を限度とします
4	効能・効果	胃痛、腹痛、さしこみ(疝痛(せんつう)、癩(しゃく))、胃酸過多、胸やけ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。) 次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。排尿困難 (6)次の診断を受けた人。心臓病、緑内障
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。