

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ミルコデ錠A
2	成分・分量	<6錠中> テオフィリン 300mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg グアイフェネシン 300mg キキョウエキス 120mg(原生薬量540mg) セネガエキス 30mg(原生薬量500mg) カンゾウエキス末 108mg(原生薬量756mg)
3	用法・用量	下記の1回服用量を食後なるべく30分以内に服用します。 <1回服用量>成人(15才以上) 2錠、15才未満は服用しないでください <1日服用回数>3回
4	効能・効果	せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、たん
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬 3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。高熱 (6)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害 <用法・用量に関連する注意> 本剤を服用している間は、効果が弱まるおそれがありますので、セイヨウオトギリソウ (セント・ジョーンズ・ワート)含有食品を摂取しないでください。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。