

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	スラジンシロップ
2	成分・分量	<10mL中> クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg、 d-メチルエフェドリン塩酸塩 12.5mg、ビタミンB6 5mg
3	用法・用量	下記の1回服用量を服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。 <1回服用量> 大人(15才以上) 10mL、11~14才 7.5mL、 7~10才 5mL、3~6才 2.5mL、3才未満 服用しないでください <1日服用回数> 2回
4	効能・効果	じんましん、湿疹・かぶれ等によるかゆみ、鼻炎
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のアレルギー用薬、 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等)</p> <p>2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。)</p> <p>3. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 授乳中の人。 (4) 高齢者。 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (6) 次の症状のある人。排尿困難 (7) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障</p> <p><用法・用量に関連する注意> 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。