

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	エアミットサットF
2	成分・分量	<4錠中> 塩酸メクリジン 50mg、スコポラミン臭化水素酸塩水和物 320 $\mu$ g、アリルイソプロピルアセチル尿素 30mg、無水カフェイン 40mg
3	用法・用量	乗物酔いの予防には乗車船30分から1時間前に、下記の1回服用量をかむか、口中で溶かして服用します。なお、症状発現時に追加服用する場合には同量を4時間以上の間隔をおいて服用してください。 <1回服用量> 11才以上 2錠、5～10才 1錠、5才未満 服用しないでください <1日服用回数> 2回を限度とします
4	効能・効果	乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等) 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)  次に該当する人はお申し出下さい (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 高齢者。 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5) 次の症状のある人。排尿困難 (6) 次の診断を受けた人。緑内障、心臓病
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。