

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | 名称 | チミコデシロップN |
| 2 | 成分・分量 | <60mL中>ジヒドロコデインリン酸塩 30mg、 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg、 カフェイン水和物 90mg、キキョウ流エキス 0.5mL(原生薬0.5gに相当)、 南天実流エキス 1.2mL(原生薬1.2gに相当) |
| 3 | 用法・用量 | 下記の1回服用量を毎食後及び必要に応じて就寝前に服用します。また、場合により1日6回まで服用できますが、その場合には約4時間の間隔をおいて服用してください。 <1回服用量>15歳以上 10mL、12~14歳 6.5mL 12歳未満 服用しないでください <1日服用回数>3回 |
| 4 | 効能・効果 | せき、たん |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。) 3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 4. 過量服用・長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出下さい (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。高熱、排尿困難 (6)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、 閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください】 |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。