

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	こどもリングルサット
2	成分・分量	<12錠中> アセトアミノフェン 600mg
3	用法・用量	下記の1回服用量を、なるべく空腹時をさけ、かむか口中で溶かして服用します。 服用間隔は4時間以上おいてください。 <1回服用量> 11～14才 4錠、7～10才 3錠、5～6才 2錠、 5才未満 服用しないでください <1日服用回数> 3回を限度とします
4	効能・効果	頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛、悪寒・発熱時の解熱
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬 3. 服用時は飲酒しないでください 4. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。