

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ストナアイビージェルEX
2	成分・分量	<6カプセル中>イブプロフェン 600mg、トラネキサム酸 750mg、 ブロムヘキシン塩酸塩 12mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、 無水カフェイン 75mg
3	用法・用量	下記の1回服用量を食後なるべく30分以内に服用します。 <1回服用量>成人(15歳以上) 2カプセル、15歳未満 服用しないでください <1日服用回数>3回
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>(3)15歳未満の小児。</p> <p>(4)出産予定日12週以内の妊婦</p> <p>(5)医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。 胃・十二指腸潰瘍、血液の病気、肝臓病、腎臓病、心臓病、高血圧、ジドブジン(レトピル等)を投与中の人</p> <p>2. 本剤を使用している間は、次の医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。)</p> <p>4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>5. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>6. 5日間を超えて服用しないでください 次に該当する人はお申し出下さい</p> <p>(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。</p> <p>(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>(3)高齢者。</p> <p>(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(5)次の症状のある人。高熱、排尿困難</p> <p>(6)次の診断を受けた人又はその病気にかかったことがある人。 胃・十二指腸潰瘍、血液の病気、肝臓病、腎臓病、心臓病、高血圧、気管支ぜんそく、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、潰瘍性大腸炎、クローン病、甲状腺機能障害、糖尿病、緑内障、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎)、血栓症を起こすおそれのある人、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。