

アラセナS購入前チェックシート

購入する前に、必ずチェックしてください。

質問項目	はい	いいえ
医師より口唇ヘルペスの診断・治療を受けたことが無いですか？	<input type="checkbox"/> 無い	<input type="checkbox"/> 有る
患部が広範囲ですか？	<input type="checkbox"/> 広範囲	<input type="checkbox"/> 広範囲でない
本剤か本剤の成分(ピダラビン)によるアレルギー症状を起こしたことがありますか？	<input type="checkbox"/> 有る	<input type="checkbox"/> 無い
使用する人は6歳未満ですか？	<input type="checkbox"/> 5歳11か月以下	<input type="checkbox"/> 6歳以上
発熱、広範囲の発疹などの全身症状がありますか？	<input type="checkbox"/> 有る	<input type="checkbox"/> 無い
患部は口唇や口唇周辺以外の部位ですか？	<input type="checkbox"/> 口唇や口唇周辺以外	<input type="checkbox"/> 口唇や口唇周辺

「はい」に1つでもチェックがある場合は医師の診療を受けてください。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)


製造販売元 佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

使用する前に必ずお読みください。

第1類医薬品

口唇ヘルペスの再発治療薬

アラセナS



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

アラセナSの特長

- 医療用で使用されているビダラビンを用いた一般用医薬品とした口唇ヘルペスの再発治療薬です。
- アラセナSの主成分であるビダラビンは、抗ウイルス作用により、口唇ヘルペスの原因となる単純ヘルペスウイルスの増殖をおさえる働きがあります。
- アラセナSは口唇ヘルペスの痛みや水疱(水ぶくれ)などの症状を緩和し、治る期間を短くします。



口唇ヘルペスとは


口唇ヘルペスは、単純ヘルペスウイルスの感染症によって引き起こされる、唇やその周りに痛みを伴う水疱(水ぶくれ)ができる病気です。

単純ヘルペスウイルスは、一度感染すると症状がなくなった後も神経細胞に住みつく特徴をもっています。

そして発熱、疲労、ストレス、月経、紫外線などで体の抵抗力が落ちるとウイルスが活発化し、再発を繰り返す特徴があります。何度も再発を繰り返す人ではその症状から再発の初期の段階で分かるといわれています。



- 1** **ビリビリ、チクチク**
再発部位の皮膚にビリビリチクチクといった違和感、かゆみ、痛み、痛がゆさなどの自覚症状を感じます。再発を繰り返す人では、この段階で口唇ヘルペスの再発と気づくようです。
- 2** **赤み・発疹**
自覚症状が現れてから数時間で、違和感やかゆみなどを感じた部位が赤く腫れてきます。
- 3** **水ぶくれ、痛み**
自覚症状が現れてから2～3日までに赤く腫れた部位に水ぶくれができます。小さな水ぶくれが群発して形成され、融合して大きな水ぶくれになることもあります。
- 4** **かさぶた**
水ぶくれは、1～2週間ほどで乾きはじめてかさぶたとなり、治癒します。



口唇ヘルペスの再発は、前駆症状があらわれてから7日～2週間程度で自然に治りますが、アラセナSで早めの手当てを行うと症状が軽くなったり、治るまでの期間が短くなります。

製品概要

【成分と働き】

100g中

成分	分量	働き
ビダラビン	3g	抗ウイルス作用により、口唇ヘルペスの症状を緩和し、治りを早くします。

【効能・効果】

口唇ヘルペスの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)

過去に医師の診断・治療を受けたことのない人は、口唇ヘルペスの再発かどうかを自分で判断することは難しいため、必ず医師の診療を受けてください。

【用法・用量】

1日1~4回、適量を患部に塗布する。
(唇やそのまわりにピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら、すぐに塗布する)

- 症状がでたら出来るだけ早く(5日以内)に使用してください。早期に使用すると治りが早く重症化しにくいので、ピリピリ、チクチクなどの違和感を覚えたらすぐに使用を開始してください。
- 使用時期は毎食後、就寝前を目安にご使用ください。
- 使用期間は10日程度が目安です。
- かさぶたができて乾燥したら使用終了です。

アラセナSを使用する前にお読みください

次の人は本剤を使用しないでください

- 医師による口唇ヘルペスの診断・治療を受けたことのない人。
医師による口唇ヘルペスの診断を受けたことのない人は自分で判断することが難しく、初めて発症した場合にはひどくなる可能性がありますので、医師の診療を受けてください。
- 患部が広範囲の人。
口唇ヘルペスの再発では、2~3mmの水ぶくれが口唇やその周辺の一箇所にいくつか集まって出来ます。水ぶくれが何箇所にもできる場合や顔面など口唇やその周辺以外にできる場合は、症状が重症であったり、他の疾患の可能性があります。
- 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 6歳未満の乳幼児。
- 発熱、広範囲の発疹等の全身症状がみられる人。

次の部位には本剤を使用しないでください

- 口唇や口唇周辺以外の部位。

次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- 医師の治療を受けている人。
- 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 授乳中の人。
- 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 湿潤やただれがひどい人。
- アトピー性皮膚炎の人。

アラセナSを使用しているときの注意事項

●長期連用しないでください

次の場合は、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください

●使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感

●5日間使用しても症状がよくなる場合、又はひどくなる場合。

●目に入らないよう注意してください。

万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。

なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

●口に入れたり、なめたりしないでください。

日常生活での注意

口唇ヘルペスの再発を防ぐためのアドバイス

口唇ヘルペスは、肉体的・精神的ストレスによって体の抵抗力が弱まると再発してしまう病気です。日ごろの健康に気をつけ、バランスの取れた食事と十分な休息をとりましょう。

口唇ヘルペスになってしまったら

次のことを心がけましょう。

1. 患部にさわらないようにしましょう。
水ぶくれの中はウイルスの量が多く、感染しやすくなっています。触った後はすぐに手を洗いましょう。
2. タオルや食器を共用しないようにしましょう。
水ぶくれに触れたタオル・衣類などは、ほかの洗濯物と一緒に洗わないようにしましょう。
食器についたウイルスでほかの人に感染することがあります。食器は洗剤で洗いましょう。
3. 水ぶくれは破らないようにしましょう。
水ぶくれを破ると痕が残る原因になることがあります。