

服用に際して、次の説明文を必ずお読みください。

ビタミン含有保健剤
ユニケルローヤルG錠

指定医薬部外品

2錠

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
3. 服用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合には直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。特に、アレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して服用してください

■成分・分量 2錠中

エレテロコック乾燥エキス
16mg(シゴカ432mgに相当)/
ニンジン乾燥エキス 41.38mg
(ニンジン600mgに相当)/乾燥
ローヤルゼリー 50mg/ビタミン
B₁硝酸塩 10mg/ビタミンB₂
12mg/ビタミンB₆ 10mg/ニコ
チン酸アミド 30mg/カルニチン
塩化物 50mg

添加物として、結晶セルロース、ヒ
プロメロース、ヒドロキシプロピ
ルセルロース、酸化チタン、ステア
リン酸Mg、ポリエチレングリコー
ル、D-マンニトール、三二酸化鉄
を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤はビタミンB₂を含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなる場合があります。

使用
期限

製造
記号

■効能 ●体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善 ●疲労の回復・予防 ●虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防 ●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防:▲疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい ▲目の疲れ ▲肩、首、腰または膝の不調 ▲冷えやすい、血行が悪い ▲二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ ●病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

■用法・用量 通常成人(15歳以上)1回2錠、1日1回服用します。★15歳未満は服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉用法・用量を守ってください。(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等にご注意ください。)

●保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)(4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



4 987316 034089

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号

お問い合わせ先 03-5412-7393



PE,金属

Ⓐ

きりくち